



Funded by 撥款資助機構



www.sie.gov.hk

Incubated by



# 藥物圖標 全面睇



藥盒




藥袋




藥瓶



藥物標籤圖像化  
食藥唔使估估下



# 藥物圖標分類介紹



## 服藥時間



早上

上午時段用藥



中午

中午時段用藥



晚上

晚上時段用藥



睡前

睡前時段用藥



飯前

餐前30分鐘  
至1小時用藥



飯後

餐後30分鐘  
至1小時用藥



需要時

相關症狀  
出現時才服用

## 服藥份量



2粒

每次服用2粒



1粒

每次服用1粒



半粒

每次服用半粒



1茶匙

每次服用1茶匙(5毫升)

## 藥物儲存



開啟後必需貯存於2°C至8°C的雪櫃內



開啟後貯存在陰涼乾燥地方

## 其他注意事項



注意：服用後有睡意，  
操作機器或駕駛會導致危險



懷孕期間不宜使用  
以免影響胎兒發育



服用藥物後，  
避免長期曝曬

## 服藥方法



完成整個療程

必需完成整個療程  
以免產生抗藥性



搖勻

用藥前搖勻以免藥物  
沉澱於底部，確保藥量正確



整粒吞服

與水整粒吞服，  
不可切割或磨碎藥片



勿與酒精  
同服

不可與含酒精  
飲料同服



與一大杯水  
同服

與最少150ml水同服  
令藥效充分發揮



咬碎

需咬碎後吞服令  
藥物較快被吸收

## 服藥途徑



眼用

塗抹/滴入眼睛



耳用

塗抹/滴入耳朵



鼻用

塗抹/滴入鼻內



搽患處(外用忌服)

藥物只限外用，  
外塗於患處



吸入

從口吸入至氣管後  
使其快速發揮功效



舌下含服

直接含於舌下  
直至完全溶解



放肛

用手指塞藥進肛門內  
(嬰兒約2厘米深，成人約3厘米深)



放陰道

用手指或投藥器  
塞藥進陰道內

# 如果你想知更多

- 1 圖標詳情
- 2 用藥資訊
- 3 健康知識



## 請即讚好Facebook專頁



Drug Icon CC 藥物圖標

[www.drugicon.cc](http://www.drugicon.cc)