



Funded by 樂款資助機構



www.sie.gov.hk

Incubated by




ادویات کا نشان یا آئیکون CC

جائزوہ



گولیوں کا ڈبہ



گولیوں کا بیگ



دوائی کی بوتل



ادویات کے لفظی لیبلز کو ادویات کے پرکشش نشان یا آئیکن میں تبدیل کرنا

ادویات کا نشان یا آئیکن CC جائزہ

دوائی کھانے کی ترتیب



صبح دوائی لین



دن میں دوائی لین



شام میں دوائی لین



سونے سے قبل دوائی لین



اکھانے سے 30 منٹ یا
ایک گھنٹہ پہلے دوائی لین



اکھانے سے 30 منٹ یا
ایک گھنٹہ بعد دوائی لین



متعلقہ علامات کے مطابق
حسبِ ضرورت دوائی لین



اینٹی بائیوٹک کی مزابمت
سے بچنے کے لیے پورا کورس ضرور مکمل
کریں



دوائی کی درست مقدار کے لیے دوائی کو اچھی طرح
بلا کر استعمال کریں



چبائیں یا پیسنے سے
گریز کریں، پوری گولی نہ لین

دوائی کی مقدار



ایک وقت میں 2 گولیاں لین



ایک وقت میں 1 گولی لین



ایک وقت پر آدھی گولی لین



ایک وقت پر 1
چمچ (5 ایم ایل) لین



آنکھوں میں ڈالیں



کانوں میں ڈالیں



ناک میں ڈالیں

ادویات کی اسٹوریج



کھولنے کے بعد کولر میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ اور 8 ڈگری
سینٹی گریڈ کے درمیان رکھیں



دوائی کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں



صرف بیرونی استعمال کے لیے
متاثرہ جگہ پر لگائیں



دوایے جلد اثرات کے لیے
سانس کے ذریعے پھیپھیوں تک پہنچائیں



زبان کے نیچے رکھیں
پہار تک کے مکمل گھل جائے

دیگر ریمارکس



احتیاط : اس سے آپکو غندوگی ہو سکتی ہے اس لیے دوائی
لینے کے بعد ڈرائیونگ نہ کریں اور نہ ہی کوئی بھاری
میشین چلاتیں



حامله خواتین دوائی استعمال
نہ کریں، یہ بچے کی نشوونما میں
اثر انداز بوجی



زیادہ دیر باہر نہ رہیں
سن سکریں کا حسبے ضرورت استعمال کریں



بچوں کے لیے معقد میں انگلی کی مدد سے
گھلنے والی گولی یا کیپسول کو 2 سی ایم تک اور
بڑوں کے لیے 3 سی ایم تک رکھیں




گھلنے والی گولی کو عورت کی شرمگاہ میں انگلی یا ایلیکٹریک کی
مدد سے رکھیں

مزید جانے کے لیے

CC ادویات کے نشان کی تفصیل

1



دوائی کی معلومات

2

صحت کی معلومات

3

ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو کریں



Drug Icon CC 藥物圖標

www.drugicon.cc